

Gestión del riesgo en la movilización de enjambres de abejas africanizadas en Colombia

2017 - 2021

INTRODUCCIÓN

✓ Las abejas *Apis Melífera* no son nativas del continente americano, fueron introducidas durante la colonia

En 1956 se introdujo la africana y en 1957 se escaparon de sus colmenas promoviendo la hibridación entre estas que generaron como resultado la abaja africanizada.

Su comportamiento:

- 1) evasivo
- 2) enjambrador
- 3) defensivo

Son de interés para la salud pública

RESULTADOS / HALLAZGOS

Se presentaron 893 casos de manejo de emergencias en Colombia durante el periodo de estudio

Los meses con mayores reportes de casos fueron: febrero (109) Marzo (100) Mayo (83)

Los departamentos con mayor reporte de casos: Bogotá (319) Cundinamarca (69) Antioquia (56)
Las picaduras (heridos) fueron 191, óbitos 4

METODOLOGÍA

Estudio observacional - descriptivo de corte trasversal

Datos obtenidos de la base de datos del reporte de manejo y control de abejas (tipo censo) Defensa Civil Colombiana (D.C)

Estudio diseñado en tres fases; 1 Gestión de la información, 2 Análisis de la información, 3 discusión y resultados.

DISCUSIÓN / APORTES

Las abejas africanizadas prestan servicios ambientales de incalculable valor

Deben generarse estrategias para disminuir muertes evitables

Debe hacerse manejo genético y apoyo a la apicultura nacional

Investigadores

José David Ovalle Páez
Profesor

Mildred Vanesa Salguero Montoya
Profesora